


- ۱۳۵- در کدام قسمت از گاز با خانواده پرستار بهداشت منوجه اعلامی پرومکالامیس در زن باردار غیرشود؟
 (۱) برنامبریزک
 (۲) تشخیص پرستاری
 (۳) سوپر فنتاز جسمی کودک
 (۴) کدام مورد است؟
- ۱۳۶- موثر نشان والدیس از نظر روانی
 (۱) سیر کوبت جوایف کودک
 (۲) افعال شنیدنی و حسنی زبان
 (۳) ترکه کردن و زها کردن
 (۴) سوزناکسید کردن
- ۱۳۷- کدام یک از گازهای موجود در هوا از مهم ترین آلوده کننده های هوا به ششها می آید؟
 (۱) مونواکسید کربن
 (۲) دی اکسید نیتروژن
 (۳) دی اکسید سرب
 (۴) استرئوسولفور
- ۱۳۸- پیشگیری سطح ۳ بر کدام دسته از فعالیتها تاکید دارد؟
 (۱) پیشوند سلامتی
 (۲) جنو گیری از پیشرفت بیماری
 (۳) باز نویسی
 (۴) تشخیص بیماری

بخش های ویژه

- ۱۳۹- برای بیمار با گاز خون شریانی $HCO_3^- = 22$, $PaCO_2 = 22$ و $pH = 7.58$ نظم مناسب کدام است؟
 (۱) الکترول منابولی حاد
 (۲) الکترول تنفسی
 (۳) الکترول متابولیک با جبران کامل
 (۴) استنور تنفسی با جبران کامل
- ۱۴۰- در درمان اختلالات اسید و باز، به طور کلی بهترین اقدام کدام است؟
 (۱) کنترل مجدد ABG
 (۲) دادن مایعات
 (۳) حفظ حداکثر اکسیژناسیون
 (۴) شناسایی و درمان علت زمینه ای
- ۱۴۱- در معیاس گمای گلاسکو، به بیماری که با تحریک دردناک چشمهاش را باز می کند، در تکمیل از اسوات نامربوط استفاده می کند و در قسمت حرکات با تحریک ترقه تکمیل درد را نشان می دهد، چه نمره ای داده می شود؟
 (۱) ۹
 (۲) ۱۰
 (۳) ۱۱
 (۴) ۱۲
- ۱۴۲- در انجام ساکشن بیمار، کدام مورد صحیح تر است؟
 (۱) کتر ساکشن برای تخلیه بهتر ترشحات، تا بیشترین حد ممکن وارد تراشه شود
 (۲) در صورت غلبه بودن ترشحات، از آب مقطر استفاده می کند
 (۳) ساکشن باز، باعث کاهش نفوذت های تنفسی می شود
 (۴) مدت زمان ساکشن، حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ثانیه باشد
- ۱۴۳- پرستار در هنگام انفوزیون الکتروولت، باید در کدام مورد، احتیاط بیشتری بعمل آورد؟
 (۱) سدیم
 (۲) کلسیم
 (۳) پتاسیم
 (۴) منیزیم
- ۱۴۴- تا چند ساعت قبل از اعمال جراحی، می توان به بیمار آن مایعات داد؟
 (۱) ۸
 (۲) ۶
 (۳) ۴
 (۴) ۲
- ۱۴۵- در صورت خروج ناخواسته لوله تراشه توسط بیمار، کدام اقدام صحیح است؟
 (۱) حمایت با اکسیژن، بوزیشن مناسب و مانیتورینگ کامل
 (۲) آرام سازی بیمار با دارو و لوله گذاری مجدد
 (۳) کنترل گازهای خون شریانی
 (۴) لوله گذاری مجدد




- ۱۲۲- در بیمار تحت تهویه غیرتهاجمی، کدام اقدام مناسبتر است؟
 ۱) بیمار است. بدن خشک و صورت قانقارگی برای پیشگیری از عفونت وجود داشته باشد.
 ۲) عدم تعادل های خونی-مغزی، هموگلوبین پایین، موکیت، موکیت، تهویه غیرتهاجمی است.
 ۳) بی توان به صورت منتهی از تهویه تهاجمی و غیرتهاجمی استفاده کرد.
 ۴) بی مهاران با کنترل بالایی راه هوایی، باید بررسی سگمنت داده شود.
- ۱۲۳- در غشیه مخاط ورید مرکزی، کدام مورد صحیح است؟
 ۱) کشش کمتر در ورید (دگانه) خطر استروک از نظر پمپاژ آنتی تست است به ورید سگمنت گلایون دارد.
 ۲) خطر ترومبوز و DVT در ورید سگمنت گلایون بیشتر از شعری است.
 ۳) در ورید سگمنت گلایون، کمتر عفونت، بیشتر است و ورید شعری است.
 ۴) ورید شعری فقط در موارد پررانی استفاده می شود.
- ۱۲۴- در کدام نوع شوک، جریان قلب پایین است؟
 ۱) نوری
 ۲) هیپووانیک
 ۳) هیپووانیک
 ۴) کاردیوژنیک
- ۱۲۵- در بیماری که مقدار اشباع اکسیژن پایین است و تحت تهویه مکانیکی است، دستکاری کدام پارامتر صحیح است؟
 ۱) تعداد تنفس
 ۲) حجم جاری
 ۳) PEEP (انتشار مثبت انتهای بازدم)
 ۴) زمان دم

۵۰

مستقیم


- ۱۲۰- مشخصه های اصلی یک سازمان رسمی، کدام است؟
 ۱) داشتن مرزهای مشخص
 ۲) تعیین اعتبار و قدرت
 ۳) تعیین زبر- مربوط به کدام مفهوم مدیریتی است؟
 ۴) یک سلسله عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر که به منظور دستیابی به یکسری اهداف تعیین و مشخص توسط یک نهاد، سازمان و یا دولت برای یک مدت معین انجام می گیرد.
- ۱۲۱- مدیریت
 ۱) برنامه ریزی
 ۲) سازماندهی
 ۳) کنترل و نظارت
 ۴) ارزیابی
- ۱۲۲- بر اساس تئوری رهبری هرمی و بلاچارد، مناسب ترین سبک رهبری برای پیروان با شیوع (MI)، کدام است؟
 ۱) از دستگه
 ۲) مشارکتی
 ۳) مستوری
 ۴) استبدادی
- ۱۲۳- هدف از حسابرسی مراقبت های پرستاری (Nursing Audit)، کدام مورد زیر است؟
 ۱) محاسبه هزینه مراقبت پرستاری
 ۲) ارزیابی کیفیت مراقبتی
 ۳) تنظیم بودجه مراقبتی
 ۴) محاسبه کمبود کسب
- ۱۲۴- اولین آموزش برای پرستار تازه استخدام طرحی در بخش بودند. کدام است؟
 ۱) آشناسازی
 ۲) آموزش مفاهیم
 ۳) آموزش شیوه مراقبت پرستاری، کارها سریع تر انجام شده و مناسب بخش هایی است که کمبود پرستار دارند.
 ۴) برابری (اصولی)
 ۵) وظیفه سنجی
- ۱۲۵- سوپروایزر بیمارستان «الف» در شیفت عصر، برای اطلاع و بررسی عملکرد کارکنان پرستاری، به بخش جراحی رفته و علاوه بر گرفتن آمار بیماران و تخت های خالی، بیماران بد حال و بیمارانی که همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفتند را از نزدیک ویزیت می کند. این اقدام سوپروایزر، به ترتیب در کدام حیطه مدیریت پرستاری قرار دارد و آیا در ایجاد انگیزه در پرسنل بخش مؤثر است؟
 ۱) حسابرسی - بله، مؤثر است.
 ۲) هدایت - بله، تأثیر مستقیم دارد.
 ۳) هدایت - خیر، تأثیر مستقیم ندارد.
 ۴) اعتباربخشی - خیر، بدون تأثیر است.



- ۱۵۷- در کدام شیوه مراقبت پرستاری قدرت تصمیم‌گیری پرستار افزایش می‌یابد، ولی نیازمند مهارت کافی در مدیریت و رهبری است؟
 (۱) گروهی
 (۲) موردی
 (۳) خودمراقبتی
 (۴) وابسته
- ۱۵۸- پایه و اساس تکنیک‌های در کار کلیان هواگرم‌کننده در شفقی کدام است؟
 (۱) ترمز از استند
 (۲) در حالت پاشش
 (۳) وجود استند
 (۴) وجود استند
- ۱۵۹- مهم‌ترین پرستاری سوپروایزر و سوپرستار در بیمارستان، از نظر سازمانی در کدام گروه زیر قرار دارند؟
 (۱) استند
 (۲) استند به وظیفه صف و کلیدی استند
 (۳) استند به وظیفه صف و کلیدی استند
 (۴) استند به وظیفه صف و کلیدی استند
- ۱۶۰- ساندویچ‌ها روش جمل مشکلی کدام است؟
 (۱) تجربه شفقی
 (۲) روش‌های گروهی
 (۳) روش‌های گروهی
 (۴) روش‌های شفقی

داخلی جراحی

- ۱۶۱- کدام‌یک از تشخیص‌های پرستاری زیر صحیح است؟
 (۱) اختلال در تصویر ذهنی به علت از دست دادن استقلال
 (۲) اختلال در حرکت فیزیکی در ارتباط با محدودیت حرکت مفاصل
 (۳) تغییر در تعدیه به علت جذب ناگهانی غذا
 (۴) تشنج‌های در ارتباط با سرطان
- ۱۶۲- اگر بخواهید به بیماری در صد مطمئن از اکسیژن برسانید کدام وسیله زیر برای این کار مناسب است؟
 (۱) ماسک ساده
 (۲) کانول بینی (Nasal cannula)
 (۳) ماسک وینچری (Venturi mask)
 (۴) ماسک با نفس مجدد بازدمی (Partial rebreather mask)
- ۱۶۳- هدف از تشویق بیمار به مصرف مایعات بعد از جراحی فکسه صدی کدام است؟
 (۱) پیشگیری از عفونت و ...
 (۲) رفع تشنگی بیمار
 (۳) حفظ تعادل مایعات بدن
 (۴) کاهش خروج ترشحات مخاطی
- ۱۶۴- کدام مایعه ثانویه پوستی است که به علت تولید بیش از حد کلان‌ایجاد می‌شود و موجب خیربودن بافت اسکاری و برجستگی نامنظم آن می‌گردد؟
 (۱) دلمه (Crust)
 (۲) قشقی شدن (Scales)
 (۳) تشنج‌ترین شکل شایعه پوستی در پسوریازیس کدام مورد است؟
 (۴) لکه‌های گرد که سطح آن یا پوسته‌های بزرگی پوشیده شده
- ۱۶۵- تاول‌های علوظیده و شل‌های تشکیل‌شده بر روی آنها
 (۱) دستهای از دریکول‌های برجسته در روی دست و پا
 (۲) شایعات پوستی به تعداد کم در سرشاس بدن
 (۳) تشنج‌های طولانی مدت بیمار ابتلا به بروز چه خطری را پیش می‌آورد؟
 (۱) تشنج
 (۲) تشنج
 (۳) تشنج
 (۴) تشنج
- ۱۶۶- در مراقبت پس از کونیزاسیون کدام مورد صحیح است؟
 (۱) انجام پیوسته بلافاصله پس از آن
 (۲) عدم استفاده از کاندوم، به هنگام مقاربت
 (۳) خارج کردن پیک و آزیمنال



۱۲۴- مددجو دارای اختلال اسکیزوفرنی است. دانی وی نیز سابقه ابتلا به این اختلال را دارد. کدام مورد زیر، در بروز اختلال روانی برای وی مطرح است؟

- (۱) ایمنولوژیکی
- (۲) اندوکرینی
- (۳) اجتماعی
- (۴) زنتیکی

۱۲۵- از تکنیک‌های ارتباطی زیر، کدام مورد می‌تواند خاصیت غیردرمانی داشته باشد؟

- (۱) سکوت
- (۲) بازتاب
- (۳) گشایش سخن
- (۴) رویارویی

۱۲۶- هدیه‌انگاری در کدام حالت زیر دیده می‌شود؟

- (۱) زمان هواخوری احساس کردم مورچه‌ها روی دستم راه می‌روند.
- (۲) برای ساختن واگن کرویلا خیلی زحمت کشیدم.
- (۳) در داخل بخش، همه درباره من حرف می‌زنند.
- (۴) دیشب آدم‌فصلی‌ها لباس‌های مرا بردند.

۱۲۷- مددجو اظهار می‌دارد که جهت درمان به بیمارستان مراجعه کرده، اما پدرش نیز در بروز بیماری وی سهیم است. در وضعیت روانی وی، کدام مورد غیرطبیعی ارزیابی می‌شود؟

- (۱) بیسش
- (۲) قضاوت
- (۳) حافظه
- (۴) درک

بهداشت جامعه

۱۲۸- از خصوصیات همه‌گیری تک‌منعی مداوم در بیماری‌های واگیردار، کدام مورد صحیح است؟

- (۱) تعداد موارد، سریعاً افزایش و کاهش می‌یابد.
- (۲) از چندین محل و منبع، به‌طور همزمان شروع می‌شود.
- (۳) طول مدت همه‌گیری، به اندازه یک دوره کمون بیماری است.
- (۴) شروع تدریجی دارد و موارد، به‌طور غیرهمزمان بروز می‌کنند.

۱۲۹- آزمونی که در صورت تکرار در فرد و شرایط یکسان، نتایج یکنواخت و ثابتی داشته باشد، نشان‌دهنده کدام‌یک از مشخصات غربالگری است؟

- (۱) ویژگی
- (۲) قابلیت اطمینان
- (۳) بازده
- (۴) حساسیت

۱۳۰- جست‌وجوی بیماری در مرحله قبل از بروز بیماری، مطابق با کدام سطوح پیشگیری است؟

- (۱) بدوی
- (۲) سطح اول
- (۳) سطح دوم
- (۴) سطح سوم

۱۳۱- واکسن‌های بدو تولد، طبق برنامه واکسناسیون ایران، کدام‌اند؟

- (۱) ب.ت.ز - هیپاتیت ب - MMR
- (۲) پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی - هیپاتیت ب
- (۳) ب.ت.ز - هیپاتیت ب - فلج اطفال خوراکی
- (۴) پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی

۱۳۲- ماهیت کدام‌یک از واکسن‌ها، آنتی‌ژن سطحی و پروس است؟

- (۱) فلج اطفال
- (۲) دیفتتری کزاز
- (۳) ب.ت.ز
- (۴) هیپاتیت ب

۱۳۳- ایمن‌سازی کودک ۹ ماهه که در موعد مقرر مراجعه نکرده، در اولین مراجعه، شامل کدام واکسن‌هاست؟

- (۱) ب.ت.ز - پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی
- (۲) ب.ت.ز - سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی
- (۳) سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی - فلج اطفال تزریقی MMR
- (۴) پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی MMR

۱۳۴- اینکه چرا بعضی افراد از خدمات بهداشتی استفاده می‌کنند و گروه دیگر این کار را نمی‌کنند، با کدام الگوی زیر، قابل توجیه است؟

- (۱) تعبیر رفتار
- (۲) باور سلامتی
- (۳) برنامه‌ریزی
- (۴) بین‌فردی

با شماره داوطلبی _____ با آگاهی کامل، بکمال توان شماره سندی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالات، لوح و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پایین پاسخنامه را تأیید می‌نماید.

امضا _____

مادران و نوزادان - کودکان

۱۰۶- در هنگام پذیرش نوزاد نرم حاصل زایمان سزارین با وزن 3300 گرم، آبشار دقیقه اول 4 و دقیقه پنجم 9 در بخش نوزادان، اولین اقدام پرستار کدام است؟

- ۱- آسپیر کردن مخاط حلقوی
- ۲- تعیین مسئولیت با شیو مادر
- ۳- پس از زایمان طبیعی، در برنامه مراقبت از مادر، کدام اقدام صحیح نیست؟
- ۴- پوشاندن نوزاد با آلبه استریل و بستن ناف

۱۰۷- بعد از اولین اجابت نوزاد، می‌تواند غذای جامد و مایعات مصرف کند

- ۱- برای تسکین پس‌زدهای پس از زایمان، از کینول مفنایک‌کسید استفاده می‌شود.
- ۲- به محض اینکه مادر قادر به راه رفتن باشد، می‌تواند از بستر خارج شده و حرکت کند.
- ۳- در صورت ایپرپاتیومی، تابش جهت لامپ و سنسوسوی پرینه، هر روز ۲ بار انجام شود.

۱۰۸- در معاینه و ارزیابی نوزاد نرم هنگام تولد نوزاد با سن هنگام تولد ۳۷ هفته، کدام مورد غیرطبیعی محسوب می‌شود؟

- ۱- فشارخون سیستولیک 70mmHg و 36.5C T
- ۲- رفلکس مورو مثبت و فونتانل فامسی ۲ سانتی‌متر
- ۳- RR = 14 / min و HR = 140 / min
- ۴- تیر سیر ۳۶ میلی‌متر و قد ۵۱ سانتی‌متر

۱۰۹- در بخش نوزادان، کدام مورد زیر، نیاز به پیگیری تخصصی دارد؟

- ۱- عدم دفع مدفوع پس از گذشت ۲۸ ساعت از تولد
- ۲- مشاهده ترشحات صورتی روی پوشک نوزاد دختر
- ۳- عدم دفع انوز در ۱۲ ساعت اول پس از تولد
- ۴- وجود موهایی لاتوگو در ناحیه کف

۱۱۰- در خصوص نوزادان بستری در بخش، کدام مورد صحیح نیست؟


- ۱- سلیروسین بیش از $16 \frac{mg}{dl}$ در نوزاد نرم ۳ روزه، نیاز به بستری در (NICU) دارد
- ۲- زردی فیزیولوژیک، از روز ۴-۵ تولد شروع و تا روز ۱۰-۷ پایتد می‌شود
- ۳- در نوزاد ۳۴ هفته، زردی تا سطح سلیروسین $15 \frac{mg}{dl}$ فیزیولوژیک است
- ۴- زردی نوزاد در پهلوهول پس از تولد ناشی از شیر مادر است

۱۱۱- کدام گروه دارویی از داروهای زیر، برای کاهش فشارخون در مادران باردار با پره‌اکلامپسی در نوبت اورژانس ضروری است؟

- ۱- نیتروگلیسرین - لاریکس - سولفاسازولین
- ۲- هیدرالازین - انالان
- ۳- هیدرالازین - سولفاسازولین
- ۴- دیازپام - متیل دوبا - کابتوپریل

۱۱۲- کلیدی‌ترین نکته که پرستاران باید در ارتباط با کودکان، به آن توجه داشته باشند، چیست؟

- ۱- وضعیت روانی عاطفی کودک و خانواده
- ۲- نوع بیماری و تأثیرات آن
- ۳- اولویت‌های خانواده و بیماری کودک
- ۴- نوع بیماری و تأثیرات آن



۱۲۶- مددجو دارای احوال استیژی و فیزیکی است. مابقی وی غیر سابقه ابتلا به این احوال را دارد. کدام مورد زیر در بروز احوال روانی برای وی مطرح است؟

- ۱) ایدئولوژی
- ۲) ایدئو کریسی
- ۳) احساسی
- ۴) زندگی

۱۲۷- از تکنیک‌های آزمائشی زیر، کدام مورد می‌تواند خاصیت غیر درمانی داشته باشد؟

- ۱) سکوت
- ۲) بازتاب
- ۳) گشتش سخی
- ۴) دیالوگ

۱۲۸- هدفان انسانیت، باز کدام حالت زیر دیده می‌شود؟

- ۱) روشن‌خواهی احساسی، گریه مورچه‌ها روی دستورات می‌روند
- ۲) برای ساختن واگن گریه خبیثی و حسرت کشیده
- ۳) در داخل بخش همه از باره من حرف می‌زنند
- ۴) نسبت آیهضاریها لبس‌های مرا برده

۱۲۹- مددجو اظهار می‌دارد که جهت درمان به بیمارستان مراجعه کرده، اما پدرش نیز در بروز بیماری وی سهیم است. در وضعیت روانی وی، کدام مورد غیرطبیعی ارزیابی می‌شود؟

- ۱) بیسش
- ۲) لغات
- ۳) حافظه
- ۴) حرکت

بهداشت جامعه

۱۲۸- از خصوصیات همه‌گیری تک‌منه‌گی مداوم در بیماری‌های واگیردار، کدام مورد صحیح است؟

- ۱) تعداد موارد سریعاً افزایش و کاهش می‌یابد
- ۲) از چگونگی محل و منبع، به‌طور هم‌زمان شروع می‌شود
- ۳) طول مدت همه‌گیری، به اندازه یک دوره کمون بیماری است
- ۴) شروع تدریجی دارد و موارد، به‌طور غیرهمزمان بروز می‌کنند

۱۲۹- آزمونی که در صورت تکرار در فرد و شرایط یکسان، نتایج یکنواخت و ثابتی داشته باشد، نشان‌دهنده کدام‌یک از مشخصات هم‌انگاری است؟

- ۱) ویژگی
- ۲) قابلیت اطمینان
- ۳) بازده
- ۴) حساسیت

۱۳۰- جستجوی بیماری در مرحله قبل از بروز بیماری، مطابق با کدام سطوح پیشگیری است؟

- ۱) ثانوی
- ۲) سطح اول
- ۳) سطح سوم
- ۴) سطح دوم

۱۳۱- واگس‌های بدو تولد، طبق برنامه واگسیناسیون ایران، کدام‌اند؟

- ۱) B - Hib - MMR
- ۲) پنج‌گانه - فلج اطفال حواری - هیپاتیت B
- ۳) B - Hib - پنج‌گانه - فلج اطفال حواری
- ۴) Hib - پنج‌گانه - فلج اطفال حواری - فلج اطفال نورینی

۱۳۲- ماهیت کدام‌یک از واگس‌ها، آنتی‌ژن سطحی و پروسی است؟

- ۱) فلج اطفال
- ۲) دیفتری کزاز
- ۳) Hib
- ۴) هیپاتیت B

۱۳۳- ایمن‌سازی کودک ۹ ماهه که در موعد مقرر مراجعه نکرده، در اولین مراجعه، شامل کدام واگس‌هاست؟

- ۱) B - Hib - پنج‌گانه - فلج اطفال حواری - فلج اطفال نورینی
- ۲) B - Hib - سه‌گانه - فلج اطفال حواری - فلج اطفال نورینی
- ۳) سه‌گانه - فلج اطفال حواری - فلج اطفال نورینی
- ۴) پنج‌گانه - فلج اطفال حواری - MMR

۱۳۴- اینکه چرا بعضی افراد از خدمات بهداشتی استفاده می‌کنند و گروه دیگر این کار را نمی‌کنند، تا کدام الگوی زیر، قابل توجه است؟

- ۱) تغییر رفتار
- ۲) برنامه‌ریزی

- ۱۶۸- در جراحی واریکوسل، مهم‌ترین مراقبت کدام است؟
 (۱) کنترل I&O بیمار
 (۲) بررسی جوشکری سیستماتیک
 (۳) دادن وضعیت نشسته به بیمار به مدت ۴ ساعت
 (۴) استفاده از کیسه‌خ و بضمند در ساعت اول
- ۱۶۹- در هیپوکالمی، مهم‌ترین تدبیر پرستاری کدام است؟
 (۱) رژیم سرشار از پتاسیم
 (۲) محدودیت مصرف پتاسیم
 (۳) مصرف پتاسیم
 (۴) استفاده از مدرها
- ۱۷۰- توصیه به تنفس آرام در یک سیستم بسته (مانند پاکت کاغذی)، از تدابیر پرستاری کدام اختلال اسید-باز است؟
 (۱) اسیدوز تنفسی
 (۲) آلکالوز تنفسی
 (۳) آلکالوز متابولیک
 (۴) اسیدوز متابولیک

- ۱۶۸- در جراحی واریکوسل، مهم‌ترین مراقبت کدام است؟
 (۱) کنترل I&O بیمار
 (۲) بررسی جوشکری سیستمیک
 (۳) دادن وضعیت نشسته به بیمار به مدت ۴ ساعت
 (۴) استفاده از کیسه‌خ و بضمبند در ساعت اول
- ۱۶۹- در هیپوکالمی، مهم‌ترین تدبیر پرستاری کدام است؟
 (۱) رژیم سرشار از پتاسیم
 (۲) محدودیت مصرف پتاسیم
 (۳) مصرف پتاسیم
 (۴) استفاده از مدرها
- ۱۷۰- توصیه به تنفس آرام در یک سیستم بسته (مانند پاکت کاغذی)، از تدابیر پرستاری کدام اختلال اسید-باز است؟
 (۱) اسیدوز تنفسی
 (۲) آلکالوز تنفسی
 (۳) آلکالوز متابولیک
 (۴) اسیدوز متابولیک

- ۱۱۳- بهترین دستور آذوقه مورد نیاز برای کاهش درد و اضطراب کودک در پروستاترهای دردناک چیست؟
 ۱) سلامت روانی کودک
 ۲) توضیح به کودک
 ۳) تحریک فکر
 ۴) لمس حسی
- ۱۱۴- منظور از درمان خودارزی در آسید کودکان کدام است؟
 ۱) سولازین پروپیل
 ۲) استیل سالیسیلیک اسید
 ۳) کنترل گلوکزها
 ۴) ویتامین D
- ۱۱۵- پروپیل سولازین گستره ای چند mg/kg/d نشان دهنده برسانی کفایت کودکان است؟
 ۱) ۴
 ۲) ۳
 ۳) ۲
 ۴) ۱
- ۱۱۶- منظور از اختلالات استنادی جهت کنترل عفونت در بیمارستان‌ها چیست؟
 ۱) اختلالات عملکردی در برخورد با خون و مایعات بدن
 ۲) اختلالات هواری در کنترل نظارت کودک هواری
 ۳) اختلالات در تماس های مستقیم و غیرمستقیم
 ۴) اختلالات نظارت نسبی در درمان مبتلگان

روان پرستاری

- ۱۱۷- مددجو به جای گفته «پاهای من» از «در روی پا» استفاده می کند. این حالت چه نام دارد؟
 ۱) سبک گفتار
 ۲) پاراسازی
 ۳) سانس پرده‌پوشی
 ۴) پرده‌کشایی
- ۱۱۸- پرستار آذوقه تو کس پرستارین و هالوپریدول را به صورت ششانی به مددجو توزیع نموده و مددجو دچار نظارتی حو کس شده است. نشانه این حالت چیست؟
 ۱) قبل از توزیع باید برای جانگزی پرستارین با پروپیل سولازین
 ۲) قبل از توزیع باید دستور پزشک به توزیع ویدی تغییر می کرد
 ۳) حوازی حاشی پرستارین پس از توزیع باید بررسی شود
 ۴) حوازی حاشی هالوپریدول پس از توزیع باید بررسی شود
- ۱۱۹- مددجو معتقد است که اطلاعات موجود در نقش همراه او به سرعت رفته است. او در کدام مورد دچار مشکل شده است؟
 ۱) درک
 ۲) حافظه
 ۳) حاشیه
 ۴) گمان
- ۱۲۰- در کدام مورد زیر، مددجو جهت مدیریت استرس خود از مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟
 ۱) پزشک موقع صحبت کردن با من، خیلی تند حرف می زند
 ۲) پرستار فکر می کند که من با هیپانگزیام مشکل دارم
 ۳) پرستار زمان ناز و دامن خیلی وقت نازد
 ۴) این گفتار پزشک مرا زودتر ترخیص کند
- ۱۲۱- مددجوی مبتلا به اختلال دوقطبی می پندارد که با آدم گولبله‌ها در ارتباط است. کدام مورد درباره او صحیح است؟
 ۱) روان نازد با نمایه روان گردان
 ۲) روان نازد با نمایه روان پریش
 ۳) روان نازد با نمایه روان پریش
 ۴) روان نازد با نمایه روان نازد
- ۱۲۲- از داروهای زیر، کدام مورد حوازی حاشی گسوی دارد؟
 ۱) هالوپریدول (Haloperidol)
 ۲) الازاپین (Olanzapine)
 ۳) تیوریدازین (Thioridazine)
 ۴) تیوتیکسین (Thioxene)
- ۱۲۳- کاربرد آموپرس در الکتروشوک چیست؟
 ۱) کنترل تحرکات مغزی
 ۲) جلوگیری از انقباضات عضلانی
 ۳) کنترل ترشحات حشی دهانی
 ۴) پیشگیری

